Lue 1°. Lue 2°. N° 6

le dessin manque

Observation
sur une Maladie singuliere
du Canal intestinal

leblanc

Au mois de fevrier 1760, un Enfant de la Ville de Meung sur loire, âgé de six ans, reçu un coup de pied, d'un jeune poullin qui n'avoit point encore été ferré dans le côté droit du ventre. La douleur fut dès l'instant assez vive: mais le moment d'aprés il fut jouer avec ses Camarades, ne ressentant qu'une petitte douleur de colique. Depuis ce moment, cette douleur a successivement augmenté, de maniere que cet Enfant faisoit des cries persans quand sa colique le prenoit, ce qui lui arrivoit huit a dix fois le jour. Dans les premiers tems, il a quelque fois vomit les alimens qu'il venoit de prendre. Les violentes Douleurs que cet Enfant ressentoit, les Cries affreux qu'il faisoit, firent soupçonner à ses parents qu'il avoit la pierre. Sa mere l'amena à notre hôpital le 11 7.bre pour y être taillé. M. Delacroix mon Confrere, le sonda et ne lui trouva point de pierre. Les medecins de l'hotel-Dieu ont mis en usage les Bains, les Clysteres, les Calmens, &c.a afin d'appaiser les violentes douleurs dont il étoit presque continuellement tourmenté: tout fut inutile.

Il mangeoit peu: mais digeroit bien, meme des oeufs durés qu'il aimoit beaucoup. on lui donnoit tantôt du gatteau, tantot du pain des confitures pour le ragouter, à le voir se promener dans la salle on l'auroit pris pour un pierreux qui attendoit le jour de l'opération.

Quinze jours avant sa mort, les douleurs qu'il ressentoit les Cries persans et les efforts qu'il faisoit, firent sortir de l'anus un boyau qu'on prit pour la chutte du Rectum de la longueur de six a sept pouces, on la fait plusieurs fois rentrer; mais, il ressortoit sur le champ. Avant que ce boyau sortit de l'anus, l'Enfant sentoit l'envie qu'il avoit d'aller a la selle; ce qui arrivoit toutes les fois que ses violentes douleurs de colique lui prenoient. Mais dès que ce boyau fut sortis les matieres couloient par l'anus; autour de ce boyau et sans que l'Enfant s'en apperçut en sans qu'il le sentit.

Cet Enfant n'a jamais eû de hoquets ni de fievre; le ventre n'a jamais été tendu, il étoit au contraire plât, se retirant en dedans, du côté des lombes. Il est devenu successivement maigre, sec, et est mort de douleurs et d'anéantissement le dix sept du présent mois d'octobre 1760.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 56 n° 6

L'ouverture de son Cadavre nous a fait voir que les intestins grelles, étoient renfermés dans un sac formé par l'Epiploon. L'Estomac parroissoit au dessus de cette Espece de sac ou poche. Nous cherchâmes inutillement la Poche Cœcale et l'arc du Colon. Sous la voute du foye nous découvrimes un bourrelet circulaire qui formoit l'entrée d'une gaîne dans la quelle étoit une portion de l'intestin Ileon, la portion du [illegible]esentere qui le tient, et une grande portion de l'Epiploon. nous ouvrimes ce [illegible]ac Epiploique. Nous fimes ensuite notre possible pour tirer et sortir de cette gai[illegible] toutes les parties qui la farcissoient, pour ainsi dire, comme une Andouille, san[illegible] pouvoir en venir about; ce qui nous fit prendre le partit de fendre l'anus et de continuer cette fente ou insision tout le long du Rectum et d'une partie du Colon jusqu'au delà même du bourrelet ou Entrée de la gaîne dont nous venons de parler. alors nous fimes rentrer, avec assez de difficulté, l'extrêmité du boyau sorti de l'anus, et le fimes passer, en le retournant, par le bourrelet qui formoit la gaîne situé vers la partie cave du foye.

Ce procedé nous fit voir que l'Extrêmité du boyau sorti par l'anus de six à sept pouces, n'étoit autre chose que la poche Cœcale, qui s'étoit détachée de ses adherances, renversée et rentrée ensuite dans le Colon, et s'est successivement introduite dans la Cavité de cet intestin, et avoit passé par l'anus. L'Ileon qui s'abouche au Cœcon; la portion du mésenterire qui l'attache avoient suivis et acompagnés cette invagination, jusqu'à l'extrêmité inferieure sortie par l'anus. La portion Epiploique qui s'attache à l'arc du Colon étoit entrainée dans cette gaîne par la rentrée et le redoublement de la portion de cet arc, de plus de six pouces de longeur.

La poche Cœcale est dure, enflammée, tumefiée ce qui nous fait penser que le coup de pied porté sur cette poche a été la cause premiere de cette maladie singulière.

La Pièce qui fait le sujet de cette observation en dit plus que la description la plus exacte, c'est la raison pour la quelle je l'envoye à l'academie sans y faire aucune préparation. J'ai seulement cousu l'insision ou la fente faite

à l'anus au Rectum et à une partie du Colon afin de mettre les parties
apeu prés dans la meme situation où nous les avons trouvées, En Examinant
cette piéce on a détaché L'Epiploon, ce qui fait qu'il ne s'en trouve plus que quelques
portion. J'ai conservé une petite portion du foye, et la vésicule du fiel que nous
avons trouvée à L'entrée de la Gaîne et un peu entrainée dans cette gaîne.

J'ai vû une hernie inguinale formée principalement par [illegible] Cœcale
operée avec succés, et dont j'ai donné l'observation à L'accademie: [illegible] jenai
jamais vû un déplacement si considerable de la poche Cœcale [illegible] un
renversement semblable.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

A Monsieur

Monsieur Bordenave Secretaire de l'Academie Royale de Chirurgie, rue de touraine près les Cordeliers

A Paris